

HÄMATOLOGISCHE ERSTVISITE

89.7_12

HÄMATOLOGISCH-ONKOLOGISCHE ERSTVISITE

89.7_5

HÄMATOLOGISCHE ERSTVISITE

Art der Visite	Maximale Wartezeit	Diagnostische Leitlinien
Dringend [U]	Erste Hilfe/innerhalb 24 h	Akute Anämie mit Hb <7g/dl
		Thrombozytopenie mit Thrombozyten <50.000/ml
		Febrile Leukopenie mit Leukozyten <1000/ml
		Isolierte Leukozytose mit Leukozyten >50.000/ml
		Leukozytose zwischen 20.000/ml und 50.000/ml, mit Thrombozyten <50.000/ml und/oder Hb <8 g/dl
		Panzytopenie (Kopräsenz von Hb <8 g/dl, Leukozyten <1.000/ml und/oder Thrombozyten <50.000/ml)
Prior [B]	Innerhalb von 10 Tagen	Nicht mikrozytäre Anämie (nicht von Eisenmangel verursacht) erster Befundung, mit MCV>90 fl und Hb<8 g/dl, in Abwesenheit einer akuten Blutungsanämie
		Leukozytose zwischen 20.000/ml und 50.000/ml, mit Thrombozyten >50.000/ml und/oder Hb >8 g/dl
		Polyglobulie erster Befundung, mit Ht >55%
		Asymptomatische Thrombozytose, nicht entzündlicher und nicht neoplastischer Genese, mit Thrombozyten ≥500.000/ml
		Lymphom oder Myelom Diagnose
		Nicht febrile Leukopenie mit Leukozyten <1000/ml
Aufschiebbar [D]	Innerhalb von 30 Tagen	Monoklonale Gammopathie erster Befundung, mit monoklonaler Peak IgG > 1.500/ml oder IgA > 1.000/ml

Art der Visite	Maximale Wartezeit	Diagnostische Leitlinien
Programmiert [P]	Leistung die über einen größeren Zeitraum geplant werden kann, da diese auf Prognose, Schmerzen, Dysfunktion oder Behinderung keinen Einfluss hat. Auf jeden Fall ist die Leistung innerhalb von 120 Tagen zu erbringen.	Asymptomatische monoklonale Gammopathie erster Befundung, mit monoklonalem Peak IgG < 1.500 o IgA < 1.000/ml