

Diabetologia

PRIMA VISITA DIABETOLOGICA

89.7A.8_3

PRIMA VISITA DIABETOLOGICA

Tipologia di visita	Tempo massimo di attesa	Indicazioni diagnostiche
Urgente [U]	Pronto soccorso/entro 24 h	Glicemia > 400 mg/dl o glicemia > 300 mg/dl con chetonuria o sintomatologia suggestiva di scompenso metabolico acuto (poliuria, polidipsia, calo ponderale ecc.), confermata quando possibile da es. di laboratorio
		Riscontro di gravidanza in donna diabetica (diabete pregravidico)
		Comparsa di ulcera al piede, o di lesioni ischemiche e/o infette agli arti inferiori
Breve [B]	Entro 10 giorni	Diabete all'esordio con HbA1c > 10%
		Ripetuti episodi di ipoglicemia di 2° e 3°
		Nuova diagnosi di insufficienza renale con velocità di filtrazione glomerulare < 30 ml/min
		Diabete gestazionale
Differibile [D]	Entro 30 giorni	Diabete all'esordio con HbA1c tra 8,5 e 10%
		Nuova diagnosi di complicanza micro o macrovascolare (escluso calo visus: urgenza clinica)
		Tipizzazione di diabete all'esordio se di difficile inquadramento diagnostico

Tipologia di visita	Tempo massimo di attesa	Indicazioni diagnostiche
Programmata [P]	Prestazione che può essere programmata in un arco temporale maggiore, in quanto non influenza prognosi, dolore, disfunzione o disabilità. Da erogarsi, in ogni caso, entro 120 giorni.	Prima diagnosi di diabete tipo 2 quando le condizioni cliniche e di compenso metabolico all'esordio e le condizioni operative consentono al MMG di procedere con le valutazioni di primo livello previste dal PDTA