

Colesterolo LDL nel plasma			
Informazioni generali			
Codice accettazione	115026		
Indicazioni cliniche [RIF.1]	- Diagnosi e monitoraggio di patologie del metabolismo lipidico - Stima del rischio arteriosclerotico		
Preparazione del paziente	Digiuno		
Richiedibile in urgenza (Valido solo per pazienti interni)	No (richiedibile nei giorni feriali dalle ore 7:00 alle ore 16:00)		
Dove effettuare il prelievo per pazienti esterni	Presso il centro prelievi del laboratorio centrale di patologia clinica di Bolzano In tutti i distretti dell'Azienda sanitaria dell'Alto Adige		
Esecuzione	Giornaliera		
Tempo di refertazione per pazienti esterni	2 giorni		
Preanalitica			
Tipo di campione	Plasma Li-eparina		
Tipo provetta	Tappo verde con inserto giallo 3,5 ml		
Trasporto del campione	A temperatura ambiente		
Trattamento del campione in laboratorio	Centrifugare entro 2h a temperatura ambiente		
Criteri per la non accettabilità del campione	Emolisi, coagulato, volume insufficiente, non corretta identificazione del paziente		
Stoccaggio del campione dopo l'analisi	7 giorni a 2-8°C		
Possibilità di richiesta su campione già processato	A seconda della stabilità del campione per il periodo di stoccaggio		
Indicazioni tecniche			
Misurando	Concentrazione plasmatica del colesterolo LDL nel plasma Li-eparina		
Metodo [RIF.2]	Test enzimatico colorimetrico in fase omogenea		
Range di riferimento [RIF.2]	40-115 mg/dl		
Stabilità del campione [RIF.3]	18-22°C: 1g	2-8°C: 7gg	-20°C: 30gg
Tempo di emivita dell'analita	ND		
Variabilità analitica (%) [RIF.4]	<1,78		
Variabilità biologica intraindividuale (%) [RIF.5]	7,8		
Differenza critica (%) [RIF.6]	22,16		
Incertezza di misura (U _m) omogeneo [RIF.4]	Livello 1 da circa 64,87 mg/dl: U _m 3,06 mg/dl Livello 2 da circa 169,66 mg/dl: U _m 7,19 mg/dl Dati estratti da Unity Real Time (Bio-Rad) nel mese di		

	dicembre 2020 (periodo: ultimi 6 mesi)
Interferenze [RIF.2]	Vedi foglietto illustrativo
Significatività clinica	
Valori elevati [RIF.1]	- Sindromi genetiche (deficit del recettore per LDL, ipercolesterolemia familiare) - Iperlipoproteinemie secondarie (obesità, diabete mellito, patologie epatiche, patologie renali, ipotiroidismo, gravidanza, contraccettivi orali, stress)
Valori bassi [RIF.1]	- Malassorbimento - Malattie mieloproliferative - Malnutrizione - Infezioni croniche - Iperitiroidismo
Parametri correlati	HDL-C, colesterolo totale, trigliceridi, creatinina, test di funzionalità epatica, TSH
Per ulteriori informazioni	
Segreteria	Tel. 0471-908306
Riferimenti bibliografici	[RIF.1] Thomas L: Labor und Diagnose. Frankfurt 2012 (8 Auflage) [RIF.2] Bugiardino [RIF.3] World Health Organization, Use of anticoagulants in diagnostic laboratory investigations and stability of blood, plasma and serum samples. WHO/DIL/LAB/99.1 Rev.2 [RIF.4] Dati interni [RIF.5] Desirable Biological Variation Database specifications - Westgard [RIF.6] Il teorema di Bayes nella diagnostica di laboratorio-Appendice E-ver 1.0
Preparato il	30.03.2021
Prossima revisione prevista	30.03.2024