

PRIMA VISITA OCULISTICA

95.02_0

PRIMA VISITA OCULISTICA. Incluso: ESAME DEL VISUS, REFRAZIONE CON EVENTUALE PRESCRIZIONE DI LENTI, TONOMETRIA, BIOMICROSCOPIA, FUNDUS OCULI CON O SENZA MIDRIASI FARMACOLOGICA

Tipologia di visita	Tempo massimo di attesa	Indicazioni diagnostiche
Emergenza [U]	Pronto soccorso	Trauma grave Causticazione o ustione grave Diplopia acuta dolente Amaurosi acuta Occhio rosso e dolente (sospetto glaucoma acuto) Ptosi acuta con cefalea (sospetto aneurisma intracranico)
Urgente [U]	Entro 24 h	Bambini: Leucocoria Mancata risposta a stimoli visivi Fotofobia, torbidità corneale, epifora (sospetto glaucoma congenito) Ptosi che occlude la pupilla Adulti: Corpo estraneo Traumi lievi Deficit visivo/campimetrico acuto (anche transitorio) Diplopia/ptosi acuta Lampi e/o mosche volanti ad esordio acuto (esclusione di rottura retinica)
		Bambini: Bambini di età inferiore agli 8 anni con visus mono-bilaterale < 5/10 Strabismo improvviso Occhiale rotto in bambini di età inferiore a 12 anni (solo se la prescrizione è stata fatta da più di 6 mesi)

Tipologia di visita	Tempo massimo di attesa	Indicazioni diagnostiche
Breve [B]	Entro 10 giorni	Adulti: Stati infiammatori interessanti occhio, palpebra, orbita, vie lacrimali resistenti a terapia Calo visivo ingravescente con metamorfopsia Retinopatia diabetica in gravidanza Entropion complicato Sospetto tumore
Differibile [D]	Entro 30 giorni	Prima visita per ipertensione arteriosa di nuova diagnosi Prima visita per diabete di nuova diagnosi Prima visita per glaucoma ingravescente Accertamenti in corso di terapie sistemiche (Plaquenil, Amiodarone, Cortisone, ecc.)
Programmata [P]	Prestazione che può essere programmata in un arco temporale maggiore, in quanto non influenza prognosi, dolore, disfunzione o disabilità. Da erogarsi, in ogni caso, entro 120 giorni.	Visita completa per difetti refrattivi* Calazio, orzaiolo non complicati Difetti di lacrimazione (secchezza oculare, stenosi dotto lacrimale, ecc.) Entropion, ectropion non complicati Famigliarità per glaucoma, maculopatia o altra patologia oculare Gerontoxon, xantomi, xantelasmi, pterigio Iper-ipo-tiroidismo (Basedow, Graves, gozzo, ecc.) Malattie autoimmuni (Sjogren, ecc.) Neoformazioni benigne (fibroma, cisti sebacea, ecc.) Invalidità, Inail... Sospetto di cataratta Strabismo
*Le visite per il monitoraggio dei difetti refrattivi successive alla prima visita vanno sempre considerate e perciò prescritte come prima visita con classe di priorità P/programmabile		