



UMC Utrecht

Mycofenolzuur (Myfortic[®]) bij constitutioneel eczeem (CE).

Afdeling Dermatologie/allergologie, locatie AZU



Mycofenolzuur (Myfortic®) bij constitutioneel eczeem (CE).

Afdeling Dermatologie/allergologie, locatie AZU

Inleiding

In overleg met uw behandelend arts heeft u besloten het geneesmiddel mycofenolzuur te gaan gebruiken. Deze folder geeft informatie over dit geneesmiddel.

Werking

Bij constitutioneel eczeem (CE) is er sprake van een ontsteking van de huid t.g.v. een overdreven afweerreactie van het lichaam op onschuldige stoffen. Mycofenolzuur remt deze afweerreactie van het lichaam, waardoor de ontsteking in de huid afneemt en het eczeem vermindert. Er is geen sprake van genezing van het eczeem.

Mycofenolzuur remt het ontstekingsproces op de langere termijn. Het kan circa vier tot acht weken duren voordat u merkt dat het medicijn begint te werken. Soms wordt de behandeling met mycofenolzuur in het begin tijdelijk (circa 3 weken) gecombineerd met prednison (zie aparte folder), omdat dit middel wel snel effect heeft, maar minder geschikt is voor langdurige behandeling.

Mycofenolzuur wordt ook toegepast bij orgaantransplantaties, meestal echter in veel hogere doseringen.

Behandelmethode

Myfortic® (mycofenolzuur natrium) is verkrijgbaar als tablet van 180 mg en 360 mg. De tabletten zijn omgeven door een maagbeschermende laag. De gebruikelijke dosis bij eczeem is meestal 2x daags 2 tabletten van 360 mg. De dosis kan soms per patiënt iets afwijken. Myfortic® kan zowel met als zonder voedsel ingenomen worden. Het is belangrijk dat u de tabletten niet breekt en/of kauwt, maar heel doorslikt.

Bijwerkingen

- Hoofdpijn
- Vermoeidheid
- Misselijkheid, braken, diarree

- Koorts.
- Verhoogde vatbaarheid voor infecties.
- Afwijkingen in het bloedbeeld.
- Verstoorde aanmaak witte bloedcellen en daardoor grotere kans op infecties.
- Verstoorde aanmaak bloedplaatjes en daardoor grotere kans op blauwe plekken, bloedneus.
- Verstoorde aanmaak rode bloedcellen en daardoor grotere kans op bloedarmoede
- Verstoring van de functie van lever en alvleesklier.

Om de bijwerkingen in een vroeg stadium te ontdekken zal er regelmatig controle van het bloed plaatsvinden.

Adviezen

- Lees de bijsluiter.
- Bespreek uw vragen met uw dermatoloog of huisarts
- Geef bij bezoeken aan andere artsen (ook tandarts) altijd aan dat u mycofenolzuur gebruikt.
- Gebruik nooit meer dan de voor u voorgeschreven hoeveelheid.
- Gebruik alcohol met mate. Dit in verband met “overprikkeling” van de lever.
- Het gelijktijdig gebruik van bepaalde maagzuurremmers en bepaalde tabletten tegen herpesinfecties kunnen van invloed zijn op de werking van mycofenolzuur: wanneer u deze middelen gebruikt, bespreek dit dan met uw dermatoloog of huisarts.
- Als u geopereerd moet worden, hoeft mycofenolzuur niet te worden gestopt.
- Bij verschijnselen van infecties zoals koorts, verkoudheid, griep, hoesten, keelpijn, ernstige kortademigheid en steenpuisten, is overleg met uw dermatoloog of huisarts noodzakelijk: het kan zijn dat de mycofenolzuur tijdelijk gestopt moet worden.

- Als u zwanger wilt worden, is overleg met uw dermatoloog of huisarts noodzakelijk. Mycofenolzuur moet tijdens de zwangerschap gestaakt worden.
- Als u mycofenolzuur gebruikt, mag u geen borstvoeding geven.
- Mannen met een kindrewens kunnen mycofenolzuur blijven gebruiken.
- Als u kunnen mycofenolzuur gebruikt, is er geen bezwaar tegen de 'grieprik'.
- Vaccinatie (nodig bij sommige verre reizen) met verzwakt levend virus, zoals het gele koorts vaccin gaat niet samen met het gebruik van kunnen mycofenolzuur. Ook vaccinaties tegen bof, mazelen, rode hond (BMR) of tuberculose mogen niet samen met kunnen mycofenolzuur worden gebruikt.

Vragen

Neem gerust contact op met de polikliniek dermatologie of allergologie van het UMC Utrecht als u vragen heeft over het gebruik van uw medicijnen.

Contact

Afdeling dermatologie/allergologie, Telefoonnummers:

Polikliniek allergologie: 088 75 563 31 (niet op woensdag)

Polikliniek dermatologie: 088 75 588 75

Divisie Interne Geneeskunde en Dermatologie
Afdeling Dermatologie

UMC Utrecht, Heidelberglaan 100, Postbus 85500, 3508 GA Utrecht
T. 088 75 555 55
www.umcutrecht.nl

© 2014, UMC Utrecht



Bezoekadres:
Heidelberglaan 100
3584 CX UTRECHT

Postadres:
Postbus 85500
3508 GA UTRECHT

www.umcutrecht.nl
T. +31 (0)88 75 555 55