

Richtlijn Pancreasenzymsuppletie per os bij sondevoeding

Het per os toedienen van pancreasenzymen bij sondevoeding.

Indien een patiënt pancreasenzymcapsules niet oraal kan/mag innemen: zie document 'Pancreasenzymsuppletie per sonde bij sondevoeding'.

Indicatie: op voorschrift arts/diëtist bij exocriene pancreasinsufficiëntie, bijvoorbeeld bij Cystic Fibrosis, chronische pancreatitis, na partiële/totale pancreas- of maagresecties.

Vorm: **kant en klare fabrieksmatig** ontwikkelde pancreasenzymen o.a;

* Creon (150 mg), Panzytrat (bevatten 10.000 EH lipase/capsule),

** Creonforte (300 mg), Pancreatine (300 mg), Pancrease HL of Panzytrat (bevatten 25.000 EH lipase/capsule),

*** Creonforte Xtra Forte (400 mg) (bevat 40.000 EH lipase/capsule).

Dosering: afhankelijk van:

- Soort sondevoeding: pancreasenzymcapsules worden voorgeschreven op basis van de hoeveelheid vet in de sondevoeding.
- Zie onderstaand **basisschema** als richtlijn voor aantal capsules per soort en liter sondevoeding.
- Indien een patiënt bekend is met pancreasenzymgebruik bij orale voeding: individuele ratio vet / lipase eenheden aanhouden bij overgaan op sondevoeding. Overleg in deze situatie met de behandelend diëtist.

Benodigd aantal kant en klare pancreasenzymcapsules per soort en liter sondevoeding			
	Creon *	Creonforte **	Creon Xtra Forte***
Soort sondevoeding			
Nutrison Energy (Multi Fibre)	6	2	2
Nutrison Protein Plus (Multi Fibre)	5	2	1
Nutrison Standard	4	2	1
Nutrison Multi Fibre	4	2	1
Nutrison Concentrated	10	4	3
Nutrison Soya	4	2	1
Nutrison Advanced Peptisorb	2	niet geschikt	niet geschikt
Vivonex Ten	-	-	-

Toediening: voor een optimale vertering en absorptie van de voedingsstoffen de capsules verdeeld over het aantal uren sondevoeding innemen met water.

Afhankelijk van het benodigd aantal capsules 2 - 6x per dag, bijvoorbeeld om 8.00-12.00-16.00-20.00-24.00-4.00 uur bij sondevoeding gedurende 24 uur of bij nachtelijke sondevoeding bij aanvang en halverwege de nacht. Overleg in deze situatie met de behandelend diëtist.

Huiswaarts met sondevoeding en pancreasenzymsuppletie: op voorschrift van de arts kan de patiënt thuis de medicatie via de eigen apotheek aanvragen.