

СОГЛАСОВАНО  
Заместитель Руководителя  
Россельхознадзора

Н. А. ВЛАСОВ

12.12.2017

## ИНСТРУКЦИЯ

по применению Максибана® G160 для профилактики  
кокцидиоза у цыплят-бройлеров

(Организация - разработчик: «Eli Lilly and Company», 2500 Innovation Way,  
Greenfield, IN 46140, USA / «Эли Лилли энд Компани», 2500 Инновейшн Вэй, г.  
Гринфилд, штат Индиана, 460140, США)

### I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: Максибан® G160 (Maxiban® G160).

Международное непатентованное наименование: наразин и никарбазин.

2. Лекарственная форма: гранулы для орального применения.

Максибан® G160 в 1 кг в качестве действующих веществ содержит наразин – 80 г и никарбазин – 80 г, а также вспомогательные вещества: минеральное масло, микромаркер- F-красный и оболочки рисовых зерен.

3. По внешнему виду препарат представляет собой гранулы от желтого до светло-коричневого и серо-коричневого цвета.

Срок годности Максибана® G160 при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 2 года с даты производства, после первого вскрытия упаковки – 6 месяцев.

Запрещается применять лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают препарат расфасованным по 25 кг в герметично закрытых многослойных бумажных мешках.

5. Хранят Максибан® G160 в закрытой упаковке производителя, отдельно от продуктов питания и кормов, в сухом, защищенном от света месте, при температуре от 5°C до 25°C.

6. Хранить в местах, недоступных для детей.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: без рецепта ветеринарного врача.

### II. Фармакологические свойства

9. Максибан® G160 относится к группе комбинированных антикокцидийных лекарственных препаратов.

10. Антикокцидийное действие лекарственного препарата обусловлено синергизмом входящих в его состав активных компонентов – наразина (ионофорный антибиотик) и никарбазина (производное динитрокарбанилида) и заключается в воздействии на состояние калий-натриевого равновесия, нарушении осмотического баланса и угнетении энергетического обмена в клетке паразита, что вызывает ее гибель. Совместное действие наразина и никарбазина замедляет развитие резистентности у кокцидий к компонентам лекарственного препарата.

Препарат активен в отношении внеклеточных бесполой форм (спорозоиты, мерозоиты) *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. mivati*, *E. necatrix*, *E. tenella*, паразитирующих у птиц.

Наразин и никарбазин практически не всасываются в желудочно-кишечном тракте и оказывают кокцидиостатическое действие на слизистой и подслизистой оболочках кишечника; выводятся из организма птиц, преимущественно, в неизменном виде с помётом: наразин в течение 24 часов, никарбазин в течение 3-5 суток.

По степени воздействия на организм Максибан® G160 относится к умеренно опасным веществам (3 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

### III. Порядок применения

11. Максибан® G160 применяют для профилактики кокцидиоза у цыплят-бройлеров.

12. Запрещается применение лекарственного препарата индейкам и животным других видов. Противопоказанием к применению является индивидуальная повышенная чувствительность животного к компонентам препарата.

13. Максибан® G160 применяют цыплятам-бройлерам в смеси с кормом в дозе 0,5-0,625 кг на 1 тонну корма (40-50 г наразина и 40-50 г никарбазина на 1 тонну корма) с первого дня жизни в течение всего периода выращивания, исключают из рациона за 5 суток до убоя.

Для обеспечения равномерного распределения суточную дозу Максибана® G160 смешивают с небольшим количеством корма (20-50 кг) и затем при тщательном перемешивании вносят в корм, рассчитанный на потребление птицей в течение суток.

14. При передозировке у птиц может наблюдаться снижение аппетита, уменьшение потребления воды и потеря массы.

15. Особенности действия препарата при его первом применении и отмене не выявлено.

16. Запрещается применение лекарственного препарата курам-несушкам.

17. Следует избегать нарушений схемы применения препарата, так как это может привести к снижению его эффективности. В случае пропуска очередной дозы, применение препарата возобновляют в той же дозе и по той же схеме.

18. При применении Максибана® G160 согласно настоящей инструкции побочных явлений и осложнений, как правило, не наблюдается.

19. Не допускается применение Максибана® G160 одновременно с другими антикокцидийными лекарственными препаратами, совместно с тиамулином и троландомицином, а также за 7 суток до начала и в течение 7 суток после окончания их применения.

20. Убой цыплят-бройлеров на мясо разрешается не ранее, чем через 5 суток после последнего применения Максибана® G160. Мясо птиц, вынужденно убитых ранее установленного срока, может быть использовано в корм пушным зверям.

#### IV. Меры личной профилактики

21. При работе с Максибаном® G160 следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

22. По окончании работы руки следует вымыть теплой водой с мылом. Людям с гиперчувствительностью к компонентам препарата следует избегать прямого контакта с Максибаном® G160. Пустую тару из-под препарата следует утилизировать с бытовыми отходами.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками глаза, их следует немедленно промыть большим количеством воды. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека, следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адреса производственных площадок производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:	«Eli Lilly and Company, Clinton Laboratories», 10500 South State Road 63, Clinton, Indiana 47842-0099, USA / «Эли Лилли энд Компани, Клинтон Лабораториес», 10500 Союз Стейт Роуд 63, Клинтон, штат Индиана 47842-0099, США.
--	--

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:	ООО «Эланко Рус», 123112, Россия, г. Москва, Пресненская набережная, 10.
--	--

С утверждением настоящей инструкции, утрачивает силу инструкция по применению Максибана® G160, утвержденная Россельхознадзором 23 октября 2015 г.

Номер регистрационного удостоверения *840-3-15.17-3962/1784 3-7.8/02626*