

TIGUVÓN® Spot-on

LEA LA ETIQUETA ANTES DE USAR ESTE PRODUCTO.

USTED ES RESPONSABLE DE SU USO Y MANEJO ADECUADO.

LAS PERSONAS NO DEBEN INGERIR ESTE PRODUCTO NI TENER CONTACTO DIRECTO

CON LA PIEL EXPUESTA.

SOLO PARA EL TRATAMIENTO DE ANIMALES.

CONTENIDO:
1 litro

COMPOSICIÓN:

Fentión (0,0-dimetil 0-[3-metil-4-(metilsulfanil)fenil] fosforotioato) 15 g
Excipiente c.s.p. 100 mL

INDICACIONES:

Tiguvón® Spot-on está indicado en bovinos para el tratamiento de Miasis Forunculosa (ura) producida por larvas de *Dermatobia hominis* y Miasis Cutánea por larvas de la mosca *Cochliomyia hominivorax*.

MODO DE USO Y DOSIFICACIÓN:

Se recomienda la aplicación de Tiguvón® Spot-on mediante el derramamiento de la dosis en un solo punto sobre la piel del animal, preferentemente en la región de la cruz.

No se debe aplicar a lo largo del dorso del animal.

Miasis Forunculosa (larvas de *Dermatobia hominis*): 1 mL para cada 15 kg de peso vivo, en dosis única.

Miasis Cutánea (larvas de *Cochliomyia hominivorax*): 1 mL para cada 10 kg de peso vivo, en dosis única.

PRECAUCIONES:

Agitar el producto antes de empezar el uso. No dosificar animales con edad inferior a 6 meses o con menos de 100 kg de peso. Para prevenir errores, no aplicar dosis en vacas que amamantan y sus crías al mismo tiempo. No tratar animales débiles, enfermos, con fascioliasis y / u otros problemas del hígado. No aplicar en animales mojados. Las lluvias después de la aplicación, no perjudican la acción del producto. No repetir el tratamiento por este motivo. No usar el producto juntamente con otros insecticidas fosforados, carbamatos o cualquier inhibidor de la colinesterasa. El uso concomitante con la fenotiazina, antihistamínicos, compuestos depresivos del sistema nervioso central, barbitúricos, xantinas, aminoglucósidos y agentes parasimpaticomiméticos debe evitarse, ya que puede aumentar la toxicidad. Encerrar las aves domésticas cuando se aplique el producto y evitar que se acerquen a animales que eliminan tórsalos. Esta medida impide que coman los parásitos y se intoxiquen. Para prevenir los posibles efectos del producto en las aves silvestres (garrapateros, gavilanes etc.) que ingieren tórsalos, se recomienda tratar los animales cuando las infestaciones alcancen niveles medios. Así, se evita la superoferta temporal de reznos a las aves, muchas veces hambrientas, como suele suceder poco después del tratamiento de animales muy infestados. Los animales que eventualmente mueran a consecuencia de la intoxicación por insecticida deben ser enterrados para evitar la muerte de las aves de presa. El producto es altamente tóxico para abejas y organismos acuáticos y puede provocar reacciones adversas de larga duración en el ambiente acuático. Mantener fuera del alcance de niños y animales domésticos. Mantener el producto en el envase original. No usar el envase vacío. No guardar o aplicar cerca de alimentos, bebidas, medicamentos, productos de aseo y domésticos. No comer, beber o fumar durante el manejo del producto. Mantener el producto lejos del fuego y del calor excesivo. En caso de uso con equipo: no desatascar boquillas, orificios y válvulas con la boca y no utilizar equipos con fugas. No aplicar el producto contra el viento. Usar guantes protectores desechables de goma y ropas de protección (camisas de mangas largas, pantalones y botas) para manejar y administrar el producto. Evitar el contacto del producto con la piel, los ojos y la

boca. El producto es tóxico en caso de inhalación o absorción por la piel y las mucosas. Evitar la ingestión del producto. Quitarse inmediatamente las ropas contaminadas por accidente. Desechar el envase y los restos de productos con seguridad, evitando contaminar el medio ambiente. No contaminar masas de agua de cualquier naturaleza. Tras el uso del producto, dejar el área de trabajo, quitarse los guantes y la indumentaria y lavarse bien las manos, la piel expuesta y la cara con agua y jabón. En caso de inhalación o aspiración, buscar un lugar ventilado. En caso de contacto con la piel, lavar la región inmediatamente con agua y jabón en abundancia. En casos muy raros, personas sensibles pueden manifestar reacciones alérgicas cutáneas individuales (alergia, irritación, hormigueo) después de la manipulación del producto. En caso de contacto directo con los ojos, lavarlos inmediatamente con agua corriente. En caso de persistencia de los síntomas cutáneos y oculares o en caso de inhalación o ingestión accidental, buscar atención médica de emergencia, llevándose consigo el envase del producto. Como cualquier otro medicamento, pueden ocurrir reacciones anafilácticas en organismos sensibles.

Lote No.
Fecha de Caducidad:

TOME SU TIEMPO SIGA LAS
RECOMENDACIONES DE LA ETIQUETA

Periodo de Restricción: En el ganado de carne guardar un intervalo de 28 días entre el tratamiento y el sacrificio de los animales para el consumo humano. No aplicar en vacas lecheras en producción.

TRATAMIENTO MÉDICO DE EMERGENCIA:

GRUPO QUÍMICO: organofosforado.

PRINCIPIOS ACTIVOS: Fentión (0,0-dimetil 0-[3-metil-4-(metilsulfanil)fenil] fosforotioato)

ACCIÓN TÓXICA: inhibidor de acetilcolinesterasa.

ANTÍDOTO: sulfato de atropina*

*Dosis y reaplicación de conformidad con la evaluación médica. Cuando sea disponible, se recomienda la asociación de reactivadores de acetilcolinesterasa.

SÍNTOMAS DE ENVENENAMIENTO:

Miosis, salivación, diarrea, bradicardia y constricción bronquial.

Convulsiones, temblores musculares y agitación pueden controlarse con la administración de diazepam por vía intravenosa. Una buena terapia de apoyo, incluyendo la terapia fluida intravenosa, apoyo nutricional, mantenimiento de la temperatura corporal y del equilibrio electrolítico deben siempre considerarse en el paciente en casos de intoxicación aguda.

Centro Nacional de Intoxicaciones: 0800-333-0160.

TELÉFONOS DE CENTROS TOXICOLÓGICOS DE TODO EL PAÍS:

Ciudad de Buenos Aires: Div. Toxicología del Hospital de Clínicas: Tel.: (011) 5950-8804/06. Hospital de Niños "Dr. Ricardo Gutiérrez": Tel.: (011) 4962-6666. Hospital de Niños "Dr. Pedro de Elizalde": Tel.: (011) 4300-2115 / 4307-5842. Hospital de Niños de La Plata: Tel.: (0221) 451-5555 / 0800-222-9911.

Santa Fe: Hospital "J. M. Cullen": Tel.: (0342) 457-3357 int. 267/8. Centro de Toxicología TAS.: Tel.: (0341) 424-2727.

Córdoba: Hospital de Urgencias: Tel.: (0351) 427-6200. Hospital de Niños: Tel.: (0351) 458-6400. Chaco: Hospital "J.C. Perrando": Tel.: (0362) 442-5050/7233 / 44-2399.

Conservar entre 15° y 30°C.

VENTA BAJO RECETA

Importado y Distribuido por: Bayer S.A. - Argentina: Ricardo Gutiérrez 3652, B1605EHD, Munro, Prov. Buenos Aires. Tel.: 0800-888-3260. Directora Técnica: Patricia L. Romano, Med. Vet., MP N° 7.119 (CPMV). ■ **SENASA Certificado N°: 19-066 Bayer S.A. - Paraguay:** Av. Santa Teresa 2245. Asunción - Paraguay. Registro SENACSA N° 1.538. Dir. Tec. Agustin Baez Reg. MAG N° 566. Telf. +595 21 617 3500. Industria Brasileña



INFLAMABLE



PELIGRO VENENO



Tiguvón®, Elanco™ y el logo de la barra diagonal son marcas registradas de Elanco™ o sus afiliadas. ©2021 Elanco™.

Elanco™