



En la cría de gallinas, ¡prevenga la infestación de moscas con NEPOREX!

En la cría de gallinas, allí donde se acumula la materia orgánica (excrementos y restos de comida) resulta un lugar ideal para la reproducción de las moscas. La aplicación del larvicida **NEPOREX** permite prevenir eficazmente el desarrollo de sus larvas, facilitando después la lucha contra las moscas adultas con **AGITA**.

NEPOREX es fácil de aplicar, ya sea esparciéndolo en seco o disuelto en agua mediante riego o pulverización, como en los siguientes ejemplos:



En suelos con rejilla, aplicar **NEPOREX** sobre la superficie del suelo, con regadera, en particular por debajo de los bebederos, de manera que al regar se mojen bien los desechos.



Con desechos más secos es indicada la aplicación directa mediante pulverización.



Con desechos no ventilados o semihúmedos aplicar **NEPOREX** esparciéndolo en seco y luego regándolo con agua a baja presión.




NEPOREX se puede aplicar sobre los suelos de la instalación ya sea en seco, esparciéndolo o bien disuelto en agua, mediante regado o pulverización. NEPOREX debe aplicarse sobre las acumulaciones de materia orgánica, que es donde las moscas se posan para desovar, es decir:

- Acumulaciones de estiércol bajo las rejillas
- Acumulaciones de estiércol no ventiladas en el exterior de las instalaciones.

Para una correcta aplicación, observe las siguientes precauciones:

- Materia orgánica seca: NEPOREX disuelto en agua
- Materia orgánica húmeda o fosas de desechos: NEPOREX esparcido en seco o disuelto en agua

En caso de rejillas, aplique NEPOREX sobre toda la superficie.

APLICACIÓN		DOSIS	SUPERFICIE DE ESTIÉRCOL
Esparcido en seco*		250 g	10 m ²
Pulverizado		250 g / 1-4 litros	10 m ²
Regado		250 g / 10 litros	10 m ²

* Se esparcerá sólo sobre estiércol húmedo

Tiempos y modalidades de aplicación de NEPOREX

Primera aplicación • En febrero-marzo

Repetición del tratamiento

- Después de la primera aparición de las moscas y hasta acumular un máximo de 10-15 cm de nuevo material orgánico; en el caso de gallineros iniciar el tratamiento con menos de 10 cm de espesor de gallinaza, y repetir cuando sea necesario

En caso de aplicación en seco, mantener a los animales fuera del contacto con el producto.

En caso de aplicación disuelto en agua, mantener a los animales fuera del contacto con el producto durante unos minutos

Utilice los insecticidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo

NEPOREX® 2SG Larvicida de gran persistencia contra las larvas de moscas que se desarrollan en el estiércol y purín de las instalaciones ganaderas. Registro n° 8712.

Elanco, Neporex y la barra diagonal son marcas registradas propiedad de o licenciadas a Eli Lilly and Company o sus filiales.

© 2017 Eli Lilly and Company y sus filiales. ESDRYNEP00001(1)