



## En la cría de conejos, ¡prevenga la infestación de moscas con NEPOREX!

En la cría de conejos, tanto las fosas con raspador como los estercoleros exteriores constituyen un lugar ideal para la reproducción de las moscas. La aplicación del larvicida **NEPOREX** permite prevenir eficazmente el desarrollo de sus larvas, facilitando después la lucha contra las moscas adultas con **AGITA**.

**NEPOREX** es fácil de aplicar, ya sea esparciéndolo en seco o disuelto en agua mediante riego o pulverización, como en los siguientes ejemplos:



En las rampas de las jaulas de cría, **NEPOREX** debe aplicarse disuelto en agua y de forma uniforme.



En las fosas **NEPOREX** debe esparcirse en seco sobre toda la superficie y después regado a baja presión con manguera de agua...






...de la misma manera, en el estercolero, **NEPOREX** se aplica esparciéndolo en seco sobre toda la superficie y después regándolo ligeramente con manguera de agua.

NEPOREX se puede aplicar sobre los suelos de la instalación ya sea en seco, esparciéndolo o bien disuelto en agua, mediante regado o pulverización.

### Para una correcta aplicación, observe las siguientes precauciones:

- Rampas de las jaulas: NEPOREX disuelto en agua y después regado o pulverizado.
- Fosas con raspador: NEPOREX esparcido en seco y después disuelto mediante el regado con agua a baja presión.
- Estercoleros: NEPOREX esparcido en seco y después disuelto mediante el regado con agua a baja presión.

En caso de rejillas, aplique NEPOREX sobre toda la superficie.

APLICACIÓN		DOSIS	SUPERFICIE DE ESTIÉRCOL
Esparcido en seco*		250 g	10 m <sup>2</sup>
Pulverizado		250 g / 1-4 litros	10 m <sup>2</sup>
Regado		250 g / 10 litros	10 m <sup>2</sup>

\* Se esparcerá sólo sobre estiércol húmedo

## Tiempos y modalidades de aplicación de NEPOREX

**Primera aplicación** • En febrero-marzo

### Repetición del tratamiento

- 1-2 días después de haber retirado el estiércol de la fosa permanente
- Rampas sobre fosas permanentes: cada 2-3 semanas
- Fosa con raspador: después de 2-3 semanas y luego en otoño
- Estercolero: una vez al mes al inicio de la estación, después cada 2-3 semanas

En caso de aplicación en seco, mantener a los animales fuera del contacto con el producto.

En caso de aplicación disuelto en agua, mantener a los animales fuera del contacto con el producto durante unos minutos

**Utilice los insecticidas de forma segura. Lea siempre la etiqueta y la información sobre el producto antes de usarlo**

NEPOREX® 2SG Larvicida de gran persistencia contra las larvas de moscas que se desarrollan en el estiércol y purín de las instalaciones ganaderas. Registro n° 8712.

Elanco, Neporex y la barra diagonal son marcas registradas propiedad de o licenciadas a Eli Lilly and Company o sus filiales.

© 2017 Eli Lilly and Company y sus filiales. ESDRYNEP00001 (1)