

ERKENNUNG

Popillia japonica ist ein Käfer, der seit einiger Zeit auch in Italien vorkommt. Die ausgewachsenen Käfer sind 10–12 mm lang, haben kupferfarbene schillernde Flügeldecken. Halsschild und Kopf sind metallisch grün. Ein charakteristisches Merkmal sind die 5 weißen Haarbüschel auf jeder Seite und die 2 größeren am Ende des Hinterleibs.



POPILLIA JAPONICA (POPIJA) – [HTTPS://GD.EPPO.INT](https://gd.eppo.int)

SYMPTOME UND SCHÄDEN

Die Schäden an den Blättern sind das Anzeichen für das Vorhandensein von *Popillia*. Die ausgewachsenen Käfer sind polyphag und aufgrund ihres ausgeprägten Herdenverhaltens findet man leicht Hunderte von Käfern auf einer einzelnen Pflanze, die sich dort ernähren. Dies kann in sehr kurzer Zeit zu schweren Schäden führen. Erhebliche Schäden sind auch an Blüten und Früchten zu beobachten, die vollständig zerstört werden können. Die Larven ernähren sich hauptsächlich von Graswurzeln.



MELDUNG UND KONTAKTE

Verdachtsfälle oder der Fund von *Popillia japonica* müssen unverzüglich dem Pflanzenschutzdienst der Provinz Bozen gemeldet werden.

Pflanzenschutzdienst der
Autonomen Provinz Bozen
Tel. 0471 415140

E-mail Adresse fitobz@provinz.bz.it oder
MyCivis.



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL · ALTO ADIGE



Weitere Informationen finden Sie auf der
Homepage des Pflanzenschutzdienstes:
[https://landwirtschaft.provinz.bz.it/de/
pflanzenschadlinge](https://landwirtschaft.provinz.bz.it/de/pflanzenschadlinge)

COLEOTTERO
GIAPPONESE
POPILLIA JAPONICA



OBSERVATION © CARSTEN-RENKER · SOME RIGHTS RESERVED

Un ospite sgradito sul nostro
territorio

COME RICONOSCERLO

Popillia japonica è un coleottero scarabeide presente da tempo in Italia. Gli adulti sono lunghi 10-12 mm con elitre iridescenti color rame e torace e testa di color verde metallizzato. Un tratto distintivo caratteristico sono i 5 ciuffi di peli bianchi presenti su ogni lato e i 2 più grandi vicino all'estremità dell'addome.



POPILLIA JAPONICA (POPIJA) - [HTTPS://GD.EPPO.INT](https://gd.eppo.int)

SINTOMI E DANNI

I danni a carico delle foglie rappresentano senza dubbio il segno più evidente della presenza di *Popillia japonica*. Gli adulti sono polifagi e per via di uno spiccato comportamento gregario è facile trovare centinaia di coleotteri su una singola pianta intenti a nutrirsi. Tutto questo può causare gravi danni in brevissimo tempo. Danni importanti si possono osservare anche a carico di fiori e frutti che possono venire completamente distrutti e spolpati. Le larve si nutrono di radici, principalmente di graminacee.



SEGNALAZIONE E CONTATTI

La sospetta presenza o il ritrovamento di *Popillia japonica* dev'essere immediatamente segnalata al Servizio fitosanitario della Provincia di Bolzano.

Servizio fitosanitario
Provincia Autonoma di Bolzano
Tel. 0471 415140
e-mail fitobz@provincia.bz.it oppure tramite
MyCivis.



Autonome Provinz Bozen
Provincia autonoma di Bolzano
Provincia autonoma de Bulsan
SÜDTIROL · ALTO ADIGE



Ulteriori informazioni sono disponibili sul sito internet del Servizio fitosanitario:
<https://agricoltura.provincia.bz.it/it/fitopatologie>

JAPANKÄFER

POPILLIA JAPONICA



OBSERVATION © CARSTEN-RENKER · SOME RIGHTS RESERVED

Ein unerwünschter Gast auf
unserem Gebiet