

# NEPOREX<sup>®</sup> 2 WDG

**Moschicida in granuli, solubile in acqua, per la lotta contro le larve di mosche**

H412: Nocivo per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

P101: In caso di consultazione di un medico, tenere a disposizione il contenitore o l'etichetta del prodotto.

P102: Tenere fuori dalla portata dei bambini.

P103: Leggere l'etichetta prima dell'uso.

P273: Non disperdere nell'ambiente.

P501: Smaltire il prodotto/recipiente in un impianto d'incenerimento autorizzato.

## Composizione

Ciromazina pura 2 g  
Coformulanti q.b.a 100 g

## Caratteristiche tecniche

NEPOREX 2 WDG agisce unicamente sulle larve delle mosche uccidendole sia che si sviluppino nelle concimaie, nelle lettiere permanenti, negli accumuli delle deiezioni, come pure in tutti gli altri substrati o siti idonei allo sviluppo larvale delle mosche.

## Modalità d'azione

NEPOREX 2 WDG interferisce sul ciclo biologico della mosca, provocando la morte delle larve. NEPOREX 2 WDG non agisce contro le mosche adulte, quindi deve essere applicato esclusivamente nei luoghi di possibile riproduzione delle mosche stesse (quali ad esempio : letamaie, lettiera permanenti).

## Modalità di impiego e dosi

Lo sviluppo delle larve di mosche avviene prevalentemente nelle lettiere lungo le pareti, i divisori e vicino a tutte le aree non calpestate dagli animali. Queste zone, di circa 50 cm di larghezza, devono essere trattate in maniera uniforme.

## Vitelli allevati su lettiera permanente e box vitelli

Il primo trattamento deve essere effettuato 1-3 gg prima dell'arrivo degli animali o dopo la comparsa delle prime mosche in primavera. Ripetere il trattamento dopo 15 giorni, secondo necessità.

## Per trattare 10 mq

*Lettiere umide*



250 g distribuiti tal quale

*Lettiere asciutte*



250 g diluiti  
in 10 lt  
di acqua



250 g diluiti  
in 1-4 lt  
di acqua

## Bovini

T trattare in modo uniforme l'intera superficie dove si accumulano le deiezioni.

Normalmente due trattamenti a distanza di 15 gg sono sufficienti

## Per trattare 10 mq :



250 g distribuiti tal quale a spaglio

Evitare di utilizzare il prodotto diluito in acqua per non rendere scivoloso il pavimento

## Suini

T trattare in modo uniforme l'intera superficie dove si accumulano le deiezioni. Effettuare il primo trattamento in coincidenza del vuoto sanitario o dopo la comparsa delle prime mosche in primavera. Ripetere il trattamento dopo 15 giorni

## Per trattare 10 mq



250 g diluiti in 10 lt  
di acqua



250 g diluiti in 1-4 lt  
di acqua

## Polli

T trattare in modo uniforme l'intera superficie dove si accumulano le deiezioni. Effettuare il primo trattamento quando lo spessore del letame è di 10 cm, ripetere il trattamento dopo 15 giorni o quando l'accumulo delle nuove deiezioni supera i 10 cm.

## Per trattare 10 mq

*Pollina umida*



250 g distribuiti  
tal quale

*Pollina asciutta*



250 g diluiti  
in 10 lt di acqua



250 g diluiti  
in 1-4 lt di acqua

## Altri usi

Tutti i substrati idonei ad ospitare lo sviluppo larvale di mosche (discariche, scarti di lavorazione nelle industrie alimentari e della lavorazione delle pelli od altro materiale). Il primo trattamento deve essere effettuato distribuendo uniformemente il prodotto sopra il substrato da trattare. Ripetere i successivi interventi ogniqualvolta lo spessore del materiale superi i 10-15 cm. NEPOREX 2 WDG deve essere distribuito alla dose di 250 g ogni 10 mq di superficie da trattare.

## Avvertenze

- Conservare in luogo inaccessibile ai bambini ed agli animali domestici.
- Conservare lontano da alimenti o mangimi e da bevande.
- Non trattare mangimi. Non contaminare durante l'uso alimenti, bevande o recipienti destinati a contenerne.
- Seguire le indicazioni fornite dal produttore
- Non disperdere il contenitore nell'ambiente dopo l'uso
- Effettuare il trattamento in assenza di animali. Subito dopo aver effettuato il trattamento delle superfici ed aerato gli ambienti, gli animali potranno essere riammessi nel loro habitat
- In caso di dispersione accidentale, per quanto possibile, raccogliere il prodotto e procedere al normale utilizzo; dopo aver raccolto il prodotto, lavare accuratamente ogni superficie ed oggetto con cui esso è venuto in contatto con acqua e sapone (od altro idoneo detergente)
- Usare guanti nella manipolazione. Dopo la manipolazione ed in caso di contaminazione lavarsi accuratamente con acqua e sapone ed in caso di disturbi ricorrere al medico.

## DA NON VENDERSI SFUSO

Presidio medico chirurgico

Registrazione n. 14566 del Ministero della Sanità

Elanco GmbH Heinz-Lohmann-Str. 4 27472 Cuxhaven

Germania Contenuto netto: 20 kg

Officina di produzione:

Lotto n° \_\_\_\_\_

Scade il \_\_\_\_\_