


Hirschkäfermännchen – Unterschiede zum Nashornkäfer

Hirschkäfer: kann fliegen, besitzt vergrößerte Oberkiefer und einen abgeflachten Kopf
Nashornkäfer: weist ein charakteristisches Horn auf, dessen vorderer Teil ausgehöhlt ist



Hirschkäfer (*Lucanus cervus*) ♂
(Archiv Amt für Natur)




Nashornkäfer (*Oryctes nasicornis*) ♂
(Archiv Amt für Natur)

Hirschkäferweibchen – Unterschiede zu ähnlichen Arten

Hirschkäfer (*Lucanus cervus*) ♀

©Audrey Marsy

Seitenflanken des Körpers in der Dorsalansicht leicht abgerundet



vorderes Schienbein mit großen Stacheln

Flügeldecken glatt, glänzend, dunkelbraun bis rötlichbraun

2-3 Stacheln am hinteren Schienbein


Balkenschröter (*Dorcus parallelipipedus*)

© Udo Schmidt CC BY-SA 2.0

Seitenflanken des Körpers parallel ausgerichtet

vorderes Schienbein seitlich gezähnt

nur ein Stachel am hinteren Schienbein



Kopf groß, fast so breit wie das Halsschild


punktierte, mattschwarze Flügeldecken

Nashornkäfer (*Oryctes nasicornis*) ♀

© Audrey Marsy

Halsschild im vorderen Bereich eingedellt

Antennen kompakter



Erscheinungsbild insgesamt eher zylindrisch