


Rilievi entomologici nel Comune di Campo Tures, con particolare attenzione alle specie elencate negli allegati della Direttiva Habitat.

Il monitoraggio, svolto nel 2021 e nel 2022, ha interessato il territorio di Campo Tures ricadente all'interno del Parco naturale Vedrette di Ries Aurina. La comunità di lepidotteri ropaloceri osservata è in linea con gli studi precedenti che hanno interessato l'area, sebbene siano state riscontrate alcune diversità. Tra le specie target è stata infatti confermata la presenza di una popolazione in buono stato di conservazione di *Parnassius apollo* nell'area di *Ursprungtal*, mentre non sono stati osservati individui di *Euphydryas aurinia* e *Phengaris arion* confermando quanto riportato da Lechner & Ortner nel 2018. Date le particolari condizioni meteorologiche delle due annualità considerate si consiglia comunque di effettuare ulteriori indagini prima di accertarne l'effettiva scomparsa dall'area di studio. Per quanto riguarda le pressioni osservate nell'area di studio sono da ricondurre ad alcune zone (fondovalle della Valle dei Dossi e Ursprungtal) dove il pascolo riduce in modo significativo la disponibilità di fioriture. In questi casi si consiglia di valutare l'impiego di alcune azioni da inserire nelle Misure per la conservazione della Zona Speciale di Conservazione (ZSC) Parco naturale Vedrette di Ries Aurina.



Parnassius apollo (archivio Ufficio Natura/Archiv Amt für Natur)

Entomologische Erhebungen in der Gemeinde Sand in Taufers mit besonderer Berücksichtigung der FFH- Arten

Die Erhebungen in der Gemeinde Sand in Taufers im Naturpark Rieserferner-Ahrn wurden im Zeitraum 2021-2022 durchgeführt. Trotz einiger Änderungen entsprach die Schmetterlingsgemeinschaft (*Rhopalocera*) im Wesentlichen jener von früheren Untersuchungen. Unter den Zielarten wurde *Parnassius apollo* mit einer gut erhaltenen Population im Ursprungtal bestätigt. Wie bereits von Lechner & Ortner (2018) festgestellt, konnten keine Individuen von *Euphydryas aurinia* und *Phengaris arion* nachgewiesen werden. Wegen besonderer Wetterbedingungen im Untersuchungszeitraum bedarf es weiterer Erhebungen, bevor man das Verschwinden der Arten im Gebiet definitiv bestätigen kann. In bestimmten Gebieten (im Talboden des Knutten- und Ursprungtals) verringert eine starke Beweidung das Blütangebot. Die Erhaltungsmaßnahmen für den Naturpark Rieserferner-Ahrn (Besonderes Schutzgebiet) sollten in solchen Fällen bestimmte Tätigkeiten vorsehen.

Finanziamento Finanzierungs	Fondi di compensazione derivanti dalla gestione di medie e grandi centrali idroelettriche (SEHP_Mühlen_MAS_14.16_P_7) Ausgleichszahlungen aus dem Betrieb von mittleren und großen Kraftwerken (SEHP_Mühlen_MAS_14.16_P_7)
Responsabile dello studio ausgeführt von	Centro Studi Bionaturalistici S.r.l.