


Cervo volante maschio - distinzione dallo scarabeo rinoceronte

Il **cervo volante** ha due grandi mandibole e una testa appiattita.
Lo **scarabeo rinoceronte** ha un solo corno, la cui parte anteriore è incavata.



Cervo volante (*Lucanus cervus*) ♂
(Archivio Ufficio Natura)



Scarabeo rinoceronte (*Oryctes nasicornis*) ♂
(Archivio Ufficio Natura)

Cervo volante femmina - distinzione da altre specie simili

Lucanus cervus - **Cervo volante** ♀
©Audrey Marsy

Fianchi laterali del corpo in visione dorsale leggermente curvati



spine grandi sulla tibia anteriore

elitre lisce e lucide, di colore marrone scuro a marrone rossastro

2-3 spine sulla tibia posteriore

Dorcus parallelipipedus
© Udo Schmidt CC BY-SA 2.0


Fianchi laterali del corpo allineati parallelamente

catene di denti sulla tibia anteriore

un'unica spina sulla tibia posteriore

testa grande, larga quasi come il pronoto


elitre nere opache con punti



Oryctes nasicornis - **Scarabeo rinoceronte** ♀
© Audrey Marsy

pronoto scavato nella parte anteriore

antenne più compatte



aspetto generale più cilindrico