

Geef aandacht aan darmgezondheid bij BL1S kuikens voor meer rendement

Elanco™

HTSi




Heeft u ook het gevoel dat het bij Beter Leven 1 Ster vleeskuikens allemaal gemakkelijker loopt? Lijkt het erop dat deze kuikens minder last van coccidiose hebben? Het tegendeel is waar; neem samen met ons een 'kijkje' in de nieuwste (darm)gezondheidsinzichten bij Beter Leven 1 Ster kuikens.


Deze waardevolle inzichten hebben we gegenereerd doordat in 5 maanden tijd maar liefst 2.365 vleeskuikens geanalyseerd werden, waarvan >700 Hubbard JA757, met behulp van Elanco's Health Tracking System (HTSi). Nog nooit werden zoveel kuikens op zo'n korte tijd onderzocht.

Ook bij conceptkuikens vormt coccidiose wel degelijk een risico

Op basis van de grafiek (figuur 1) merken we op dat ook bij BL1S kuikens een duidelijke coccidiosepiek aanwezig is. Bij dit kuikensconcept treedt de coccidiosepiek een week later op dan bij reguliere vleeskuikens om vervolgens af te nemen. Opmerkelijk is dat de coccidiosedruk weer toeneemt in de tweede helft van de ronde waardoor coccidiose gedurende de hele ronde een bedreiging vormt bij BL1S kuikens¹.



Figuur 1: Evolutie coccidioseverloop Hubbard JA757 (2022-2023) en Ross 308 (2017-2019)




De darmgezondheidscore (I²) bij BL15 kuikens varieert dan ook door de ronde heen, zo zal deze afnemen naarmate de coccidiosedruk toeneemt (figuur 2). Daarnaast merken we op dat er heel wat variatie in darmgezondheid is tussen dieren van een bepaalde leeftijdscategorie en dus ruimte voor verbetering. In de leeftijdscategorie dag 44 tot dag 56 heeft 25% van de kuikens een I² score lager dan 90, in de leeftijdscategorie dag 29 tot dag 36 is dit zelfs tussen de 25% en 50%¹.

Figuur 2: Gemiddelde I² bij BL15 per leeftijdscategorie

Kies voor een coccidioseprogramma wat rekening houdt met leeftijd en risico's

Het gebruik van een gepotentieerd ionofoor (Maxiban) tot voorbij de coccidiosepiek, gevolgd door een enkelvoudig ionofoor (Monteban) tot slacht is ook bij BL15 kuikens aangewezen voor een optimale bescherming tegen coccidiose. Zeker omdat BL15 kuikens risico lopen op 2 extra coccidiosestammen; namelijk *Eimeria brunetti* en *Eimeria necatrix* die normaal enkel bij leggende dieren worden aangetroffen en kunnen leiden tot verhoogde uitval en verminderde voeropname².



Figuur 3: Coccidiose preventieprogramma

Referenties

1. Elanco data on file
2. Elanco data on file

Monteban® G100: coccidiostaticum op basis van narasin. **Europees toelatingsnummer:** E765 **Indicatie:** Als hulpmiddel ter voorkoming van coccidiose veroorzaakt door *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* en *E. tenella*. Dit toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in mengvoeder verwerkt. **Waarschuwing:** Niet gelijktijdig toedienen met een ander coccidiostaticum in het voer of met bepaalde geneesmiddelen, zoals tiamulin. **Wachttijd:** 0 dagen. Lees voor gebruik de productinformatie. **Verantwoordelijke:** BE: Elanco Belgium BV, Generaal Lemanstraat 55/3, 2018 Antwerpen, België (αBE105334) +32 3 334 30 00 NL: Elanco Nederland BV, Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, Nederland (αNL220758) +31 30 307 92 45

Maxiban® G160: coccidiostaticum op basis van narasin en nicarbazine. **Europees identificatienummer:** 5 1 772 **Indicatie:** Ter preventie van coccidiose in mestkippen veroorzaakt door *Eimeria acervulina*, *E. brunetti*, *E. maxima*, *E. necatrix* en *E. tenella*. Dit toevoegingsmiddel wordt in de vorm van een voormengsel in mengvoeder verwerkt. **Waarschuwing:** Niet gelijktijdig toedienen met een ander coccidiostaticum in het voer of met bepaalde geneesmiddelen, zoals tiamulin. **Wachttijd:** 0 dagen. Lees voor gebruik de productinformatie. **Verantwoordelijke:** BE: Elanco Belgium BV, Generaal Lemanstraat 55/3, 2018 Antwerpen, België (αBE105334) +32 3 334 30 00 NL: Elanco Nederland BV, Van Deventerlaan 31, 3528 AG Utrecht, Nederland (αNL220758) +31 30 307 92 45

Elanco Animal Health