



## Medicatielijst bronchiale provocatietest - Longfunctie UMC Utrecht

De arts heeft voor u een test aangevraagd om te bepalen of er sprake is van prikkelbare luchtwegen/astma. Om dit onderzoek betrouwbaar te kunnen uitvoeren, is het belangrijk dat u (indien van toepassing) op tijd stopt met onderstaande medicatie. Wilt u bij medicijnen die een combinatie zijn van meerdere soorten, bij het stoppen uitgaan van de langste stoptijd? Dank voor uw medewerking!

Let op: In onderstaande tabel wordt zowel de stofnaam van het medicijn genoemd als de merknaam genoemd. Controleer dus op de verpakking van uw medicijn welke stofnamen en/of merknaam er op staan.

Aantal uren stoppen	Stofnaam	Te vinden in onder andere (merknaam):
168 uur ( 1 week)	glycoperronium	Bevespri, Seebri, Trimbrow, Trixeo, Ultibro, Xoterna
	tiotropium	Spiriva, Spiolto, Tiotrus
	umeclidinium,	Anoro, Incruse, Trelegy
	roflumilast	Daxas
48 uur	indacaterol	Anoro, Incruse, Trelegy, Onbrez, Ultibro, Xoterna
	vilanterol	Anoro, Relvar, Trelegy
	olodaterol	Spiolto, Striverdi
36 uur	acridinium	Duaklir, Eklira
	salmeterol	Aerivo, Airflusal, Busalair, Elpenhaler, Seretide, Serevent
	formoterol	Duoresp. Flutiform, Foradil, Foster, Symbicort, Bevespi
12 uur	ipratropium	Atrovent, Berodual, Combivent
6 uur	salbutamol	Airomir, Ventolin
	terbutaline	Bricanyl
	fenoterol	Berodual

Het is niet nodig om te stoppen met:

Merknaam	Stofnaam
Qvar	Beclometason
Flixotide	Fluticason
Pulmicort	Budesonide
Alvesco	Ciclesonide
Singulair	Montelukast

Voor vragen kunt u contact opnemen met de longfunctieafdeling: tel. 088-7557257