



УТВЕРЖДАЮ
Генеральный директор
ООО «Эланко Рус»
А.А. Плохова
14 января 2020 г.

ИНСТРУКЦИЯ по применению Непорекс™ 2 SG для борьбы с личинками мух

(организация-производитель компания Schirm GmbH / «Ширм ГмбХ», Германия)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование: Непорекс™ 2 SG (Neporex™ 2 SG).
Международное непатентованное наименование: циромазин.
2. Форма выпуска: водорастворимые гранулы.
Непорекс™ 2 SG в качестве действующего вещества (ДВ) содержит циромазин (2-циклопропиламино-4,6-диамино-с-триазин) – 2%, а в качестве вспомогательных компонентов – полиэтиленгликоль – 0,03% и мочевины – до 100%.
3. Выпускают Непорекс™ 2 SG в полиэтиленовых пакетах и контейнерах.
Срок годности при соблюдении условий хранения – 5 лет со дня изготовления.
Непорекс™ 2 SG запрещается применять по истечении срока годности.
4. Хранят препарат в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищенном от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 2°C до 30°C.
5. Непорекс™ 2 SG следует хранить в местах, недоступных для детей.
6. Неиспользованный препарат или его рабочий раствор уничтожают отдельно от бытовых отходов в специально отведенных местах, вдали от источников питьевой воды и водоемов.

II. Фармакологические свойства

7. Непорекс™ 2 SG – инсектицидный препарат.

Циромазин, входящий в состав инсектицидного препарата, является регулятором роста насекомых, действует на личинок насекомых путём ингибирования синтеза хитина, активен в отношении обитающих в животноводческих помещениях личинок мух, включая *Musca spp.*, *Stomoxys calcitrans*, *Drosophila spp.*, *Lucilia spp.*

Под действием циромазина нарушается процесс развития личинки, которая погибает до превращения во взрослую особь. Непорекс™ 2 SG не действует на куколку и взрослую особь.

Непорекс™ 2 SG по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007-76).

III. Порядок применения

8. Непорекс™ 2 SG применяют для дезинсекции животноводческих помещений, других объектов ветеринарного надзора против личинок мух.

9. Препаратом обрабатывают места размножения насекомых. Не подлежат обработке места скопления насекомых (потолки, стены и т.д.), так как Непорекс™ 2 SG не действует на взрослых особей.

10. Непорекс™ 2 SG применяют путем сухого рассеивания, опрыскивания или смачивания мест размножения насекомых раствором препарата из расчета 0,5 г ДВ на 1 м² поверхности.

Метод сухого рассеивания применяют для обработки влажного или жидкого навоза путем непосредственного равномерного нанесения.

Метод опрыскивания включает в себя приготовление раствора препарата и опрыскивание поверхностей мест размножения мух с помощью механического или автоматического оборудования для распыления.

Метод смачивания предполагает обработку мест размножения насекомых раствором препарата с помощью лейки.

Одновременной обработке подлежат все места размножения насекомых.

Нормы расхода препарата на 10м² поверхности представлены в таблице 1.

Таблица 1

Тип помещения	Количество Непорекса™ 2 SG для обработки 10 м² поверхности		
Коровники			
Глубокая подстилка: Обработать полосу шириной около 50 см вдоль стен, вокруг и под стойлами, где подстилка не утаптывается животными, обработать края и области разлива вокруг кормушек и поилок, места скопления навоза. Домики для телят на улице: Обработать все поверхности путем распыления или смачивания примерно через 3 дня после удаления навоза. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух.	Смачивание 250 г на 7,5 литров воды	Опрыскивание 250 г на 2,5 литра воды	
Коровники с решетчатым полом: Обработать всю поверхность пола сразу после очистки навозной ямы. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух.	Сухое рассеивание 250 г		
Свинарники			
Решетчатый пол: Обработать всю поверхность пола сразу после очистки навозной ямы. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух. Система все пусто - все занято: Обработать путем сухого распыления немедленно после уборки помещения, до постановки животных. Глубокая подстилка: Обработать путем опрыскивания или смачивания через 3 дня после удаления навоза. Повторять обработку после каждого удаления навоза или обнаружения личинок мух. Обработать всю поверхность навоза и области разлива вокруг кормушек и поилок.	Сухое рассеивание 250 г	Смачивание 250 г на 7,5 литров воды	Опрыскивание 250 г на 2,5 литра воды
Птичники			
Обработать всю поверхность через 1 неделю после удаления помета. Повторять обработку после каждого удаления помета или обнаружения личинок мух.	Влажная подстилка	Сухая подстилка	
	Сухое рассеивание 250 г	Смачивание 250 г на 7,5 литров воды	Опрыскивание 250 г на 2,5 литра воды

11. Повторные обработки проводят через 2 недели.

12. Обработку проводят в отсутствие животных. Запрещается обрабатывать инсектицидным раствором кормушки, поилки и поверхности, с которыми будут контактировать продукты питания, корма и животные.

13. Не рекомендуется использовать препарат в смеси с другими пестицидами.

IV. Меры личной профилактики

14. Все виды работ с Непорексом™ 2 SG проводят, соблюдая общие правила гигиены и техники безопасности, с использованием средств индивидуальной защиты (хлопчатобумажный костюм или халат, резиновые перчатки, головной убор, респиратор и защитные очки).

15. К работе не допускаются беременные и кормящие грудью женщины, лица моложе 18-летнего возраста и имеющие противопоказания для работы с инсектицидными средствами.

16. При приготовлении и применении рабочего раствора Непорекса™ 2 SG следует избегать пыления и попадания гранул или раствора на кожу, в глаза, органы дыхания и внутрь.

В случае загрязнения не рабочих поверхностей продуктом или рабочим раствором, их следует тщательно очистить, соблюдая правила защиты окружающей среды, собрав раствор или гранулы в соответствующую емкость для дальнейшей утилизации.

17. Во время работы запрещается принимать пищу, пить и курить. По окончании работы лицо и руки следует вымыть теплой водой с мылом, рот прополоскать водой.

18. При несоблюдении мер предосторожности и попадании Непорекса™ 2 SG или его рабочего раствора на кожу, загрязненные места следует вымыть большим количеством проточной воды с мылом, при попадании в глаза их следует тотчас в течение нескольких минут промыть большим количеством проточной воды, при попадании в дыхательные пути пострадавшего следует немедленно вынести на свежий воздух, обеспечив тепло и состояние покоя и немедленно обратиться за медицинской помощью; при попадании внутрь следует немедленно обратиться за медицинской помощью.

19. Пустые емкости из-под инсектицидного средства запрещается использовать для бытовых целей или сжигать. Они подлежат утилизации с бытовыми отходами.

20. Организация-производитель: Schirm GmbH: Dieselstrasse 8, D-85107 Baar-Ebenhausen, Germany (Германия).

Инструкция разработана компанией ООО «Эланко Рус» и Schirm GmbH, Германия