

СОГЛАСОВАНО
Заместитель Руководителя
Россельхознадзора



16.03.2016

ИНСТРУКЦИЯ

по применению АурогранаTM 20% порошка для лечения телят, свиней и сельскохозяйственных птиц при болезнях бактериальной этиологии

(Организация-разработчик: «Elanco Europe Ltd.», Lilly House, Priestley Road, Basingstoke, Hampshire RG24 9NL, UK / «Эланко Юроп Лтд.», Лилли Хаус, Пристли Роуд, г. Бейсингсток, графство Гэмпшир, RG24 9NL, Великобритания)

I. Общие сведения

1. Торговое наименование лекарственного препарата: АурогранTM 20% порошок (AurogranTM 20% powder).

Международное непатентованное наименование: хлортетрациклин.

2. Лекарственная форма: порошок для орального применения.

АурогранTM 20% порошок содержит в 1 г в качестве действующего вещества хлортетрациклин в форме гидрохлорида – 200 мг, а в качестве вспомогательных веществ карбонат кальция, а также продукты ферментации хлортетрациклина.

3. По внешнему виду препарат представляет собой однородный порошок от коричневого до темно-коричневого цвета.

Срок годности лекарственного препарата при соблюдении условий хранения в закрытой упаковке производителя – 3 года с даты производства.

Запрещается использовать лекарственный препарат по истечении срока годности.

4. Выпускают АурогранTM 20% порошок расфасованным по 25 кг в бумажные мешки, ламинированные полиэтиленом. Каждая единица потребительской упаковки снабжается инструкцией по применению.

5. Хранят АурогранTM 20% порошок в закрытой упаковке производителя, отдельно от пищевых продуктов и кормов, в сухом, защищённом от прямых солнечных лучей месте, при температуре от 0°C до 25°C.

6. АурогранTM 20% порошок следует хранить в недоступном для детей месте.

7. Неиспользованный лекарственный препарат утилизируют в соответствии с требованиями законодательства.

8. Условия отпуска: отпускается без рецепта ветеринарного врача.

II. Фармакологические свойства

9. АурогранTM 20% порошок относится к антибактериальным лекарственным препаратам группы тетрациклина.

10. Хлортетрациклина гидрохлорид, входящий в состав препарата, обладает широким спектром антибактериального действия, активен в отношении большинства грамположительных и грамотрицательных микроорганизмов, в том числе эшерихий, сальмонелл, пастерелл, стафилококков, стрептококков, бордепелл, а также риккетсий и некоторых видов микоплазм; не действует на синегнойную палочку, протей, большинство грибов и мелких вирусов.

Механизм бактериостатического действия антибиотика основан на подавлении белкового синтеза микробной клетки (блокада функции рибосом) и блокаде синтеза РНК.

После перорального применения хлортетрациклин постепенно всасывается в желудочно-кишечном тракте и довольно быстро проникает в органы и ткани, достигая максимальных концентраций через 2-4 часа и сохраняясь на терапевтическом уровне – до 8-12 часов.

Выделяется антибиотик из организма в неизмененном и метаболизированном виде, главным образом с фекалиями и мочой, у лактирующих самок частично с молоком.

Аурогран[™] 20% порошок по степени воздействия на организм относится к малоопасным веществам (4 класс опасности по ГОСТ 12.1.007).

III. Порядок применения

11. Аурогран[™] 20% порошок назначают с лечебной и лечебно-профилактической целью телятам и свиньям при пастереллезе, колибактериозе, сальмонеллезе, бронхопневмонии, гастроэнтероколитах, вызванных микроорганизмами, чувствительными к тетрациклинам; цыплятам и индошатам – при колибактериозе и сальмонеллезе.

12. Противопоказанием к применению лекарственного препарата является повышенная индивидуальная чувствительность животного к антибиотикам тетрациклической группы. Не допускается применение Аурограна[™] 20% порошка животным с выраженным поражением печени и почек, а также жвачным с развитым рубцовым пищеварением.

13. Аурогран[™] 20% порошок применяют животным индивидуально или групповым способом в смеси с кормом в течение 5-7 суток.

Суточная доза свиньям, цыплятам и индошатам составляет 0,1 г (20 мг хлортетрациклина) на 1 кг массы животного (птицы).

Суточная доза телятам составляет 0,2 г (40 мг хлортетрациклина) на 1 кг массы животного.

В период лечения свиньи и птицы должны получать только корм, содержащий лекарственный препарат.

14. При передозировке лекарственного препарата возможно снижение аппетита и кратковременное нарушение функции желудочно-кишечного тракта.

15. Особенностью действия лекарственного препарата при его первом применении и отмене не установлено.

16. Не допускается применение лекарственного препарата курам-несушкам, в связи с накоплением хлортетрациклина в яйцах.

17. Следует избегать пропуска очередной дозы препарата, так как это может привести к снижению терапевтической эффективности. При пропуске одной или несколько доз Аурограна[™] 20% порошка курс применения необходимо возобновить в предусмотренных дозировках и схеме применения.

18. Побочных явлений и осложнений у птиц, телят и свиней при применении препарата согласно настоящей инструкции, как правило, не наблюдается. При повышенной индивидуальной чувствительности к тетрациклинам и появлении аллергических реакций, использование лекарственного препарата прекращают и проводят десенсибилизирующую терапию.

19. Не допускается применение Аурограна[™] 20% порошка совместно с антацидами, каолином, препаратами, содержащими железо, магний, кальций и алюминий, а также одновременно с бактерицидными антибиотиками.

20. Убой телят и свиней на мясо разрешается не ранее, чем через 12 суток, цыплят и индошат – не ранее, чем через 10 суток после последнего применения Аурограна[™] 20% порошка.

Мясо животных, вынужденно убитых ранее установленных сроков, может быть использовано в корм пушным зверям.

IV. Меры личной профилактики

21. При применении лекарственного препарата следует соблюдать общие правила личной гигиены и техники безопасности, предусмотренные при работе с лекарственными препаратами.

Пустую тару из-под препарата запрещается использовать для бытовых целей; она подлежит утилизации с бытовыми отходами.

22. Во время работы с лекарственным препаратом запрещается пить, курить и принимать пищу. Лица, работающие с лекарственным препаратом, должны быть одеты в спецодежду (халат, брюки, головной убор, резиновые перчатки, респиратор) и обеспечены очками закрытого типа. В местах работы должна быть аптечка первой доврачебной помощи. После работы с лекарственным препаратом необходимо вымыть руки с мылом.

23. При случайном контакте лекарственного препарата с кожей или слизистыми оболочками, их необходимо промыть большим количеством воды. Людям с гиперчувствительностью к хлортетрациклину следует избегать прямого контакта с Аурограном™ 20% порошком. В случае появления аллергических реакций или при случайном попадании препарата в организм человека следует немедленно обратиться в медицинское учреждение (при себе иметь инструкцию по применению препарата или этикетку).

Наименование и адрес производственной площадки производителя лекарственного препарата для ветеринарного применения:

«Zhumadian Huazhong Chia Tai Co., Ltd»; No. 2019, Leshan Road, High Technology Development Zone, Zhumadian, Henan 463000, China / «Жумадиан Хуажонг Чия Тай Ко., Лтд», №. 2019, Лешан Роуд, Хай Текнолоджи Девелопмент Зон, Жумадиан, Хенан 463000, Китай.

Наименование, адрес организации, уполномоченной владельцем или держателем регистрационного удостоверения лекарственного препарата на принятие претензий от потребителя:

ООО «Эланко Рус», 123317, Россия, Москва, Пресненская набережная, 10.

С утверждением настоящей инструкции утрачивает силу инструкция по применению Аурограна™ 20% порошка, утвержденная Россельхознадзором 30 января 2013 г.

Номер регистрационного удостоверения 826-3-38.12-3064-ПЗИ-3-38.12-103901