

# comfortis™

## spinosad/espinosad 90 mg spinosad/espinosad 140 mg spinosad/espinosad 270 mg spinosad/espinosad 560 mg

### USO VETERINARIO COMPRIMIDO MASTICABLE ANTI-PULGAS 90 mg - 140 mg - 270 mg - 560 mg para PERROS Y GATOS

Para uso en perros y cachorros, gatos y gatitos, a partir de las 14 semanas de edad.

Comienza a eliminar las pulgas 30 minutos después de ser administrado, siendo 100% efectivos a las 4 horas en perros y 24 horas en gatos.

Elimina las pulgas antes de que éstas pongan huevos.

<b>COMPOSICIÓN:</b>	
Cada comprimido contiene:	
Spinosad/Espinosad .....	90 / 140 / 270 / 560 mg (según concentración de cada presentación)
Excipientes c.s.p. ....	168,76 / 262,52 / 506,26 / 1050,05 mg (respectivamente, según concentración de cada presentación).

**INDICACIONES DE USO:** Para la prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*), en perros y cachorros, gatos y gatitos, a partir de la 14 semanas de edad. El uso preventivo contra reinfestaciones se debe a la actividad adultocida y a la reducción en la producción de huevos que posee, la cual persiste hasta 30 días posteriores a la administración de una dosis única. Es recomendable iniciar el uso de COMFORTIS un mes antes de que las pulgas comiencen a ser activas y continuando hasta el final de la temporada de pulgas. Para controlar la población de pulgas en lugares muy infestados, puede ser necesario tratamientos mensuales periódicos con el producto COMFORTIS. Para mayor información, consulte al Médico Veterinario.

COMFORTIS puede ser usado como parte del tratamiento estratégico en el control de la Dermatitis Alérgica a la Picadura de Pulga (DAPP).

**DOSES, FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:** Dosis de Principio Activo: **Perros**: 30 – 60 mg de spinosad/espinosad/kg de peso corporal. **Gatos**: 50 – 75 mg de spinosad/espinosad/kg de peso corporal.

Dosis de Producto: administrar 1 comprimido de COMFORTIS en dosis única, cada 30 días, a perros y gatos de acuerdo a la siguiente tabla.

Presentación COMFORTIS	Peso del perro	Peso del gato
90 mg	1,5 - 2,2	1,2 - 1,8
140 mg	2,3 - 4,5	1,9 - 2,7
270 mg	4,6 - 9,0	2,8 - 5,4
560 mg	9,1 - 18,0	5,5 - 11,0

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:** COMFORTIS se debe administrar por vía oral junto con el alimento o inmediatamente después de haber comido. La duración de su eficacia podrá verse reducida si se administra con el estómago vacío.

**ADVERTENCIAS, INTERACCIONES Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:** Si ocurre vómito antes de 1 hora de su administración, vuelva a dar otro comprimido. Use con precaución en perros y gatos con antecedentes de convulsiones y epilepsia. No se recomienda el uso concomitante de COMFORTIS con ivermectina en dosis alta fuera de la indicación de etiqueta (en reportes post comercialización, se han descrito temblores/fascioulaciones, salivación/babeo, ataxias, ataxia, midriasis, cojera y desorientación luego de su uso concomitante con ivermectina en dosis alta fuera de la indicación de etiqueta).

Todos los perros y gatos habitantes de la casa deben ser tratados. Las pulgas pueden persistir por un periodo de tiempo luego de ser administrado el producto debido a la aparición de pupas adultas desde pupas ya existentes en el medio ambiente.

**MANTENER FUERA DEL ALCANCE DE LOS NIÑOS**

**CONTRAINDICACIONES:**

No usar en cachorros y gatitos de menos de 14 semanas de vida. No usar en casos de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa. No administrar a hembras preñadas o en lactancia. No administrar en animales reproductores.

**EFFECTOS NO DESEADO Y REACCIONES ADVERSAS:** Tanto en **perros** como en **gatos**, el efecto no deseado observado más frecuentemente es el vómito, el cual ocurre comúnmente dentro de las siguientes 48 horas de administrado el producto. En la mayoría de los casos el vómito es transitorio, suave y no requiere tratamiento sintomático.

Las reacciones adversas adicionales observadas en los estudios clínicos fueron:

**Perros:** disminución de apetito, letargia, diarrea, tos, polidipsia, vocalización, incremento en el apetito, enjordecimiento de la piel, hiperactividad y salivación excesiva. Estas reacciones fueron consideradas como ligeras y no resultó en ningún perro eliminado de los estudios. Desde la introducción de COMFORTIS, los efectos colaterales que se han reportado son incoordinación, prurito, temblores y convulsiones. **Gatos:** otras reacciones adversas observadas fueron diarrea y anorexia. Letargia, pérdida de la condición corporal y salivación fueron poco comunes. Convulsiones fue una reacción adversa rara.

**SORDESDOS:** En **perros**, a dosis excesivas respecto de la recomendada, el vómito se ha vuelto el evento más común. A dosis 2.5 veces la dosis recomendada, espinosad causó vómito en la gran mayoría de los perros. A dosis por sobre los 100 mg/kg de peso al día, el único signo clínico de sobredosis fue el vómito, ocurrió generalmente luego de 2.5 horas posterior a la dosificación. Leves aumentos de ALT (alanin amino transferasa) ocurrió en todos los perros tratados con COMFORTIS, a pesar de que éstos retornaron a su valor normal al día 24. También ocurrieron fosfatidasa (vocalización de tejidos linfoides), aunque esto no se relacionó con signos clínicos en perros tratados hasta por 6 meses. En **gatos** el evento más común observado fue vómito, el cual no estuvo relacionado con un incremento en la dosis del producto. Otros signos observados fueron disminución del apetito, deposiciones blandas y fosfatidasa (vocalización) del hígado, pulmones y glándulas adrenales.

No existe un antídoto disponible. En el caso de signos clínicos adversos, tratarlos sintómicamente. En el evento posible de sobredosificación, contacte al Médico Veterinario.

**PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR:** La persona que administre el tratamiento deberá lavarse bien las manos luego de realizado. Ingestión accidental podría causar reacciones adversas. En caso de ingestión accidental acuda inmediatamente al médico y muestre el inserto o envase del producto.

**PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DE PRODUCTO SIN UTILIZAR O MATERIAL DE DESECHO:** No eliminar directamente al medio ambiente sino en contenedores dispuestos para basura. No eliminar envases vacíos o con restos del producto en cursos de agua.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Almacenar a temperatura ambiente entre 15 - 30°C, en un lugar fresco y seco.

**PRESENTACIONES:** Estuche con un blíster unitario.

**PRECAUTAS ACERCA DEL PRODUCTO:**
**¿Quié son los comprimidos masticables COMFORTIS?** Son comprimidos con sabor a carne que se le administran a su mascota (perro y/o gato) para eliminar y prevenir la infestación de pulgas durante un mes. Se recomienda administrar un comprimido masticable de COMFORTIS mensualmente a perros y gatos a partir de las 14 semanas de edad.

**¿Por qué el veterinario prescribe los comprimidos masticables de COMFORTIS?** El Médico Veterinario ha prescrito este medicamento bien sea para tratar una infestación existente de pulgas en su mascota (perro y/o gato) o para prevenir futuras infestaciones.

**¿Qué debería discutir con el Médico Veterinario acerca de los comprimidos masticables COMFORTIS para mi perro y/o gato?** El Médico Veterinario es el experto en tratar la salud de su mascota y puede hacer la mejor recomendación en cuanto a medicamentos para tratar y prevenir la infestación de pulgas se refiere. Los puntos clave de discusión pueden incluir los siguientes:

• El tratamiento con comprimidos masticables COMFORTIS puede comenzar en cualquier época del año, preferentemente desde un mes antes de que las pulgas lleguen a ser activas y continuando hasta el final de la temporada de pulgas. Para controlar la población de pulgas en lugares muy infestados, puede ser necesario tratamiento periódicos con el producto COMFORTIS. Para mayor información consulte al Médico Veterinario.

• Si se olvida dar una dosis, administrar el comprimido masticable COMFORTIS con los alimentos y volver a retomar el régimen de dosificación mensual.

• Para reducir al mínimo la probabilidad de re-infestación de pulgas, es importante tratar a todos los perros y/o gatos que viven dentro de un mismo hogar con los comprimidos masticables COMFORTIS.

• Los comprimidos masticables COMFORTIS son para uso exclusivo en perros y gatos, no para uso en otros animales ni en seres humanos.

**¿Cómo se deben administrar los comprimidos masticables COMFORTIS a mi perro y/o gato?** COMFORTIS es un comprimido masticable listo para ser consumido por el perro y/o gato cuando es ofrecido por el dueño junto con el alimento o inmediatamente después. Alternativamente, los comprimidos pueden ser ofrecidos en el alimento o administrarse como otros medicamentos en comprimidos. Administrar un comprimido masticable COMFORTIS una vez al mes.

**¿Qué pasa si se le dan más comprimidos a su perro y/o gato de lo prescrito por el Médico Veterinario?**

Los comprimidos masticables COMFORTIS han sido probados en muchos tipos de perros y gatos y no han sido reportadas reacciones de eventos adversos graves. Tasas elevadas de dosificación se manifestaron con incremento de vómito. Sin embargo, en el evento posible de sobre dosificación, contacte al Médico Veterinario quien es el experto de la salud de su mascota.

**¿Es necesario restringir la actividad o el contacto con mi perro y/o gato después de que consume el comprimido?** Como COMFORTIS es una formulación oral, usted puede mantener las actividades normales y las interacciones con su perro y/o gato.

**¿Qué tan rápido actúan los comprimidos masticables COMFORTIS para matar las pulgas?** Según estudios realizados, una vez se administra el comprimido masticable COMFORTIS a perro y/o gato, las pulgas empiezan a morir a los 30 minutos alcanzando el 100% de efectividad dentro de las siguientes 4 horas en perros y 24 horas en gatos. Las pulgas mueren antes de que éstas pongan huevos.

**¿En caso de que vea pulgas en mi perro y/o gato luego de administrar COMFORTIS, indicaría que el tratamiento no está funcionando?**

COMFORTIS mata las pulgas antes de que éstas puedan poner huevos solo si se utiliza mensualmente de acuerdo a las instrucciones de la etiqueta. Recuerde que todos los animales en el hogar deben ser tratados con un producto anti-pulgas aprobado con el fin de ayudar a controlar la población de pulgas. Las pulgas hembras que viven en los animales, producen huevos que caen en el entorno de los animales. Estos huevos eclosionan en unas semanas, las larvas emergen a continuación y hejen capullos para convertirse en pupas. El ciclo de vida se puede completar en tan solo tres semanas con nuevas pulgas adultas que emergen de las pupas para saltar sobre el animal. Debido a que cada pulga hembra puede poner hasta 50 huevos por día, existe la acumulación de huevos, larvas y pupas hasta llegar a su fase adulta en el medio ambiente.

Independientemente del producto utilizado para matar las pulgas, el perro y/o gato puede seguir siendo expuesto a las pulgas que viven en el medio ambiente. Cuando estas pulgas saltan sobre el perro y/o gato COMFORTIS las elimina rápidamente.

Si dentro de un mes después de que su mascota haya recibido el comprimido masticable COMFORTIS ve que aún tiene pulgas, lo más probable es que estas sean pulgas nuevas que hayan surgido hace poco tiempo de las pupas y saltaron sobre el perro y/o gato.

Estas nuevas pulgas morirán rápidamente antes de que puedan producir los huevos que contaminen el medio ambiente.

**¿Es seguro darle a mi perro y/o gato, y a hembras en reproducción, gestación y lactancia los comprimidos masticables COMFORTIS?**

Se ha demostrado que los comprimidos masticables de COMFORTIS son seguros en perros y gatos saludables de cualquier raza, cuando son usadas de acuerdo a las indicaciones descritas en la etiqueta. La seguridad fue establecida en cachorros y gatitos a partir de las 14 semanas de edad y perros y gatos adultos, tanto en estudios de laboratorio y de campo. Es importante que discuta con el Médico Veterinario acerca del uso de los comprimidos masticables COMFORTIS antes de comenzar a usarlos en caso tal de que su mascota presente antecedentes de epilepsia. En estudio de seguridad en especies de laboratorio (ratas y conejos) spinosad/espinosad no tuvo evidencia de efectos teratogénicos, teratóxicos o maternotóxicos, así como tampoco efecto en la capacidad reproductiva en hembras ni en machos. En hembras preñadas, la seguridad de spinosad/espinosad no ha sido suficientemente establecida. En perros, spinosad/espinosad se excreta por el calostro y la leche de hembras en lactación por un periodo de 35 días posteriores a la administración oral, razón por la cual se asume que spinosad/espinosad se excreta también por el calostro y leche de gatas en lactación. La seguridad de estos cachorros y gatitos lactantes no ha sido suficientemente establecida. La seguridad del producto en machos destinados a la reproducción no ha sido determinada.

**¿Cuáles son los efectos colaterales al administrar los comprimidos masticables COMFORTIS a su perro y/o gato?** En algunos casos el perro y/o gato puede presentar vómito después de recibir el comprimido. Si ocurre vómito dentro de una hora de la administración, vuelva a dar otro comprimido. Durante los estudios clínicos no ocurrió vómito.

**¿Cuáles son los efectos colaterales al administrar los comprimidos masticables COMFORTIS a su perro y/o gato?** En algunos casos el perro y/o gato puede presentar vómito después de recibir el comprimido. Si ocurre vómito dentro de una hora de la administración, vuelva a dar otro comprimido. Durante los estudios clínicos no ocurrió vómito.

**¿Pueden administrarse otros medicamentos mientras su perro y/o gato toma los comprimidos masticables COMFORTIS?** Si, los comprimidos masticables COMFORTIS se han administrado de forma segura con una amplia variedad de productos y medicamentos.

Evite el uso concomitante de COMFORTIS con ivermectina a dosis alta fuera de etiqueta. Es importante que el Médico Veterinario esté al tanto de otros productos que usted le esté suministrando a su mascota.

**ELABORADO POR:**

Abbvie Inc., 1 N. Waukegan Rd., North Chicago, Illinois, 60064 USA

**PARA:**

Elanco Animal Health

División de Eli Lilly and Company, Indianapolis, Indiana 46285 USA

**Importado y Distribuido por:**

**Argentina**

**Eli Lilly Interamérica Inc.**

Tromador 4830, piso 12 (C1430DNN)

Buenos Aires, Argentina.

Inscripción N°: 11799

**Bolivia**

**SENASA**

Certificado N°: 13-057

Dir. Técnico: M.V Pablo Giudice

Mel. Prof. 8.832

VENTA BAJO RECETA

Centro Nacional de Infracciones 0-800-333-0160

**Bolivia**

**Importado por: GUC SRL**

Reg. SENASAG PU+ F N° 007894/17

Dirección: Av. Capitán Arrien N° 140, Santa Cruz, Bolivia

Teléfono: 3362644

**Chile**

**Eli Lilly Interamérica Inc. y Cía. Ltda.**

Rosario Norte 553 of 1903, Piso 19,

Las Condes, Santiago, Chile.

Bajo Licencia de Eli Lilly and Company USA.

Venta Bajo Receta Médico Veterinaria.

Reg. SAG Comfortis 90 mg: 2258-B

Reg. SAG Comfortis 140 mg: 2246-B

Reg. SAG Comfortis 270 mg: 2260-B

Reg. SAG Comfortis 560 mg: 2260-B

**Uruguay**

**Empresa Registrante: LANODIR S.A.**

(N° Reg. 261)

Técnico Responsable: Dr. Pablo Canibuez

Teléfono: +598 23621216

CIAT TOXICOLOGÍA Av. Italia 2870 Parque Batlle, Montevideo Hospital de Clinicas piso 7

Tel.: 1722

**NO SE DEBE ENTERRAR, QUEMAR, TIRAR A CURSOS DE AGUA O DESTRUIR DE CUALQUIER OTRA FORMA, DE DEBERA RECOMENDAR LLEVAR A LOS CENTROS DE ACOPIO**

**CORRESPONDIENTES AL PLAN DE RECUPERO DE ENVASES ADHERIDO A LA FIRMA.**

Registro DILAVE N° Comfortis 90 mg:

Registro DILAVE N° Comfortis 140 mg: 2014A00144

Registro DILAVE N° Comfortis 270 mg: 2014A00145

Registro DILAVE N° Comfortis 560 mg: A-2223

**SERVICIO DE ATENCIÓN AL CLIENTE:**

**Argentina Tel: 0800 777 3526**

**Chile Tel: + 56 2 26119529**

Comfortis, Elanco y el logo de la barra diagonal son marcas de Elanco o sus afiliadas.

CA421

CA422

CA423

CA424

PA100630X

**Elanco**

# Comfortis™

## spinosad/espinosad 810 mg spinosad/espinosad 1620 mg

### USO VETERINARIO COMPRIMIDO MASTICABLE ANTI-PULGAS 810 mg - 1620 mg para PERROS

Para uso en perros y cachorros a partir de las 14 semanas de edad.

Comienza a eliminar las pulgas 30 minutos después de ser administrado, siendo 100% efectivo a las 4 horas.

Elimina las pulgas antes de que éstas pongan huevos.

<b>COMPOSICIÓN:</b>	
Cada comprimido contiene:	
Spinosad/Espinosad .....	810 / 1620 mg (según concentración de cada presentación)
Excipientes c.s.p. ....	1518,84 / 3037,69 mg (respectivamente, según concentración de cada presentación).

**INDICACIONES DE USO:** Para la prevención y tratamiento de infestaciones por pulgas (*Ctenocephalides felis*), en perros a partir de la 14 semanas de edad.

El uso preventivo contra reinfestaciones se debe a la actividad adultocida y a la reducción en la producción de huevos que posee, la cual persiste hasta 30 días posteriores a la administración de una dosis única. Es recomendable iniciar el uso de COMFORTIS un mes antes de que las pulgas comiencen a ser activas y continuando hasta el final de la temporada de pulgas. Para controlar la población de pulgas en lugares muy infestados, puede ser necesario tratamientos mensuales periódicos con el producto COMFORTIS. Para mayor información, consulte al Médico Veterinario.

COMFORTIS puede ser usado como parte del tratamiento estratégico en el control de la Dermatitis Alérgica a la Picadura de Pulga (DAPP).

**DOSES, FRECUENCIA Y DURACIÓN DEL TRATAMIENTO:**

Dosis de Principio Activo: **Perros**: 30 – 60 mg de spinosad/espinosad/kg de peso corporal.

Dosis de Producto: administrar 1 comprimido de COMFORTIS en dosis única, cada 30 días, a perros s de acuerdo a la siguiente tabla.

Presentación COMFORTIS	Peso del perro
810 mg	18.1 - 27.2
1620 mg	27.3 - 54.5

**VÍA DE ADMINISTRACIÓN Y MODO DE EMPLEO:**

COMFORTIS se debe administrar por vía oral junto con el alimento o inmediatamente después de haber comido. La duración de su eficacia podrá verse reducida si se administra con el estómago vacío.

**ADVERTENCIAS, INTERACCIONES Y PRECAUCIONES ESPECIALES DE USO:** Si ocurre vómito antes de 1 hora de su administración, vuelva a dar otro comprimido.

Use con precaución en perros con antecedentes de convulsiones y epilepsia. Todas estas reacciones fueron consideradas como ligeras y no resultó en ningún perro eliminado del estudio. Desde la introducción de COMFORTIS, los efectos colaterales que se han reportado son incoordinación, prurito, temblores y convulsiones. En **gatos:** otras reacciones adversas observadas fueron diarrea y anorexia. Letargia, pérdida de la condición corporal y salivación fueron poco comunes. Convulsiones fue una reacción adversa rara.

**¿Pueden administrarse otros medicamentos mientras su perro y/o gato toma los comprimidos masticables COMFORTIS?** Si, los comprimidos masticables COMFORTIS se han administrado de forma segura con una amplia variedad de productos y medicamentos.

Evite el uso concomitante de COMFORTIS con ivermectina a dosis alta fuera de etiqueta. Es importante que el Médico Veterinario esté al tanto de otros productos que usted le esté suministrando a su mascota.

**ELABORADO POR:**

No usar en cachorros de menos de 14 semanas de vida.

No usar en casos de hipersensibilidad conocida a la sustancia activa.

No administrar a hembras preñadas o en lactancia.

No administrar en animales reproductores.

**EFFECTOS NO DESEADO Y REACCIONES ADVERSAS:**

En **perros**, el efecto no deseado observado más frecuentemente es el vómito, el cual ocurre comúnmente dentro de las siguientes 48 horas de administrado el producto. En la mayoría de los casos el vómito es transitorio, suave y no requiere tratamiento sintomático.

Las reacciones adversas adicionales observadas en **perros** en los estudios clínicos fueron: disminución de apetito, letargia, diarrea, tos, polidipsia, vocalización, incremento en el apetito, enjordecimiento de la piel, hiperactividad y salivación excesiva. Estas reacciones fueron consideradas como ligeras y no resultó en ningún perro eliminado de los estudios. Desde la introducción de COMFORTIS, los efectos colaterales que se han reportado son incoordinación, prurito, temblores y convulsiones.

**SORDESDOS:**

En **perros**, a dosis excesivas respecto de la recomendada, el vómito se ha vuelto el evento más común. A dosis 2.5 veces la dosis recomendada, espinosad causó vómito en la gran mayoría de los perros. A dosis por sobre los 100 mg/kg de peso al día, el único signo clínico de sobredosis fue el vómito, ocurrió generalmente luego de 2.5 horas posterior a la dosificación. Leves aumentos de ALT (alanin amino transferasa) ocurrió en todos los perros tratados con COMFORTIS, a pesar de que éstos retornaron a su valor normal al día 24. También ocurrieron fosfolipidasa (vocalización de tejidos linfoides), aunque esto no se relacionó con signos clínicos en perros tratados hasta por 6 meses.

No existe un antídoto disponible. En el caso de signos clínicos adversos, tratarlos sintómicamente.

En el evento posible de sobredosificación, contacte al Médico Veterinario.

**PRECAUCIONES ESPECIALES PARA EL OPERADOR:** La persona que administre el tratamiento deberá lavarse bien las manos luego de realizado. Ingestión accidental podría causar reacciones adversas. En caso de ingestión accidental acuda inmediatamente al médico y muestre el inserto o envase del producto.

**PRECAUCIONES ESPECIALES PARA LA DISPOSICIÓN DE PRODUCTO SIN UTILIZAR O MATERIAL DE DESECHO:** No eliminar directamente al medio ambiente sino en contenedores dispuestos para basura. No eliminar envases vacíos o con restos del producto en cursos de agua.

**CONDICIONES DE ALMACENAMIENTO:** Almacenar a temperatura ambiente entre 15 - 30°C, en un lugar fresco y seco.

**PRESENTACIONES:** Estuche con un blíster unitario.

**PREGUNTAS ACERCA DEL PRODUCTO:**

**¿Qué son los comprimidos masticables COMFORTIS?**

Son comprimidos con sabor a carne que se le administran a su perro para eliminar y prevenir la infestación de pulgas durante un mes. Se recomienda administrar un comprimido masticable de COMFORTIS mensualmente a perros a parte de las 14 semanas de edad.

**¿Por qué el veterinario prescribe los comprimidos masticables de COMFORTIS?** El Médico Veterinario ha prescrito este medicamento bien sea para tratar una infestación existente de pulgas en su perro o para prevenir futuras infestaciones.

**¿Qué debería discutir con el Médico Veterinario acerca de los comprimidos masticables COMFORTIS para mi perro?** El Médico Veterinario es el experto en tratar la salud de su mascota y puede hacer la mejor recomendación en cuanto a medicamentos para tratar y prevenir la infestación de pulgas se refiere. Los puntos clave de discusión pueden incluir los siguientes:

• El tratamiento con comprimidos masticables COMFORTIS puede comenzar en cualquier época del año, preferentemente desde un mes antes de que las pulgas lleguen a ser activas y continuando hasta el final de la temporada de pulgas. Para controlar la población de pulgas en lugares muy infestados, puede ser necesario tratamiento periódicos con el producto COMFORTIS. Para mayor información consulte al Médico Veterinario.

• Si se olvida dar una dosis, administrar el comprimido masticable COMFORTIS con los alimentos y volver a retomar el régimen de dosificación mensual.

• Para reducir al mínimo la probabilidad de re-infestación de pulgas, es importante tratar a todos los perros y/o gatos que viven dentro de un mismo hogar con los comprimidos masticables COMFORTIS.

• Los comprimidos masticables COMFORTIS son para uso exclusivo en perros, no para uso en otros animales ni en seres humanos.

**¿Cómo se deben administrar los comprimidos masticables COMFORTIS a mi perro?** COMFORTIS es un comprimido masticable listo para ser consumido por el perro cuando es ofrecido por el dueño junto con el alimento o inmediatamente después. Alternativamente, los comprimidos pueden ser ofrecidos en el alimento o administrarse como otros medicamentos en comprimidos. Administrar un comprimido masticable COMFORTIS una vez al mes.

**¿Qué pasa si se le dan más comprimidos a su perro de lo prescrito por el Médico Veterinario?** Los comprimidos masticables COMFORTIS han sido probados en muchos tipos de perros y no han sido reportadas reacciones de eventos adversos graves. Tasas elevadas de dosificación se manifestaron con incremento de vómito. Sin embargo, en el evento posible de sobre dosificación, contacte al Médico Veterinario quien es el experto de la salud de su mascota.

**¿Es necesario restringir la actividad o el contacto con mi perro después de que consume el comprimido?** Como COMFORTIS es una formulación oral, usted puede mantener las actividades normales y las interacciones con su perro.

**¿**