

Son birkaç yıldır yapılan arařtırmalar, birok otistik bireyin intihar riskinin arttıđını gstermektedir. Bu alıřmada, Hollanda Otizm Kayıt'sından katılımcılar, otizimli bireyleri ieren uzunlamasına bir kayıt olan, intihar dřünceleri ve duygularıyla ilgili olası deneyimlerini sorgulandı. zellikle, bu dřüncelerin ve duyguların hayatları boyunca ve son bir ay iinde yařadıkları faktrlerle (yař, cinsiyet ve psikiyatrik bozukluk tanıları gibi) iliřkili olup olmadıđı incelendi. Katılımcıların %80'inin hayatlarının bir dneminde intihar dřünceleri yařadıđı veya intihar giriřiminde bulunduđu bulundu. Ayrıca, katılımcıların bir alt grubunda, psikiyatrik bozukluk tanısının varlıđı, yalnızlık hissi ve daha fazla otistik zelliklerin, hayatları boyunca intihar dřünceleri ve duyguları yařama ile iliřkili olduđu bulundu. Son bir ay iinde bu intihar dřüncelerini yařayanlar iin, birden fazla psikiyatrik bozukluk tanısı ve daha fazla otistik zelliklerin, bu dnemde daha řiddetli ve sık intihar dřünceleri ile iliřkili olduđu grld. Bu bulgular, otistik bireylerde intihar riskini deđerlendirirken ek faktrlerin gz nnde bulundurulması gerektiđini gstermektedir. Bu, neden otistik bireylerde intiharın daha sık grldđn anlamaya bir adım daha yaklařtırıyor.